Virocid

Desinfectante en solución concentrada

Composición

Cada 100 ml de Virocid contienen:

Cloruro de alquildimetilbencilamonio.....17,0 %
Glutaraldehído.....10,7 %
Cloruro de didecildimetilamonio .....7,8 %
Excipientes c.s.p.....100,0 %

Características: Desinfectante virucida, bactericida y fungicida. Actividad frente a circovirus, Fiebre Aftosa, Peste porcina clásica. Enfermedad de Aujeszky, Influenza aviar, Enfermedad de Gumboro, Salmonella, *E. coli*, etc.

Área de aplicación: Uso ganadero. Para uso en instalaciones ganaderas y avícolas, incubadoras, clínicas veterinarias, parques zoológicos, arcos de desinfección, vehículos ganaderos, etc.
Uso exclusivo por personal especializado.

Modo de empleo:

Desinfección rutinaria - 1:400 (100 ml en 40 litros de agua). Aplicar la solución a razón de 300 ml/m^2. Desinfección ante brotes de enfermedad - 1:200.

Termonebulización - Diluir 1 litro en 4 l. de agua para 1000 m^3. Lanza de espuma - 1:200. Pediluvios - 1:50.

Aplicar en ausencia de animales. Una vez aplicado el tratamiento, dejar secar unos 30 minutos aproximadamente antes de proceder a la entrada de los animales al área tratada.

Consejos de Prudencia:

Líquidos y vapores inflamables. Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo en caso de inhalación. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Nocivo en contacto con la piel. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Mantener alejado de fuentes de calor/chispas/llama abierta/superficies calientes. No fumar. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. Se necesita un tratamiento específico. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente:

La intoxicación puede provocar: De irritación a quemaduras caústicas de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Dermatitis de contacto y sensibilización. Acidosis metabólica, depresión del SNC, daño hepático y edema pulmonar.

Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. Lave los ojos con abundante agua, al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. No administrar nada por vía oral. En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Translade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 04 20

Antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta.

Contenido: Envases de 5 y 20 litros

Nº de Registro: 0201-P

Fabricado por:
CID LINES N.V.

Titular:
CID LINES Iberica, S.L. Calle Felipe Prieto, 4 1º F
34001 Palencia

Distribuido por: Bayer Hispania, S.L. Av. Baix Llobregat, 3-5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona) Tel 93 495 65 00