# ACTIFUCIN®

Solución concentrada
Desinfectante fungicida
USO VETERINARIO

**Composición**
Enilconazol . . . . . 150 mg
Excipiente c.s.p. . . . . 1 ml

**Características farmacológicas**
Enilconazol, derivado del imidazol, es un potente fungicida y esporicida de síntesis que a débiles concentraciones inhibe el crecimiento de los hongos, especialmente de los dermatofitos (géneros *Trichophyton* y *Microsporum*) y del *Aspergillus fumigatus*.
Actúa por inhibición de la síntesis del ergosterol, componente esencial de la membrana celular de hongos y levaduras. Los excipientes empleados en ACTIFUCIN hacen posible que la emulsión diluida permita una buena adherencia de Enilconazol a las superficies sobre las cuales se aplica (paredes, suelo, jaulas, utensilios, etc.), asegurando una eficacia prolongada.

**Indicaciones**
Saneamiento ambiental y prevención de las infestaciones por hongos dermatofitos (tiñas) en perros, gatos, conejos, équidos y bóvidos.
Complemento idóneo de la terapéutica antifúngica, tópica u oral en las referidas especies.
Control y prevención de infestaciones por *Aspergillus fumigatus* en salas de incubación e instalaciones avícolas.

**Posología y modo de empleo**
ACTIFUCIN se utiliza siempre diluido en agua al 1 por 100 (10 ml/litro de agua), para formar una emulsión que contenga 1,5 mg de sustancia activa por litro.

**PERROS, GATOS, EQUIDOS Y BOVIDOS**
En animales afectados de tiña, y a fin de evitar su reinfestación, el tratamiento oral o tópico ha de ser complementado con la desinfección antifúngica de su entorno, mediante la aplicación de la emulsión diluida de ACTIFUCIN, finamente pulverizada sobre el ambiente donde se encuentren habitualmente, así como sobre todos los objetos de contacto habitual como mantas, collares, cestas, esteras, arneses, paredes y suelos de sus alojamientos, etc.
Esta desinfección se efectuará 2 veces por semana, durante 2-3 semanas.

**CONEJOS**
Con la emulsión diluida de ACTIFUCIN efectuar una fina pulverización sobre las jaulas de los animales, paredes y suelo del conejar, a razón de 1 litro de emulsión diluida por cada 30 $m^2$ de superficie. En presencia de infestación, 2 veces por semana durante 2-3 semanas. Preventivamente, 1 ó 2 aplicaciones mensuales y por sistema, tras la limpieza o desinfección en los vacíos sanitarios.

**SALAS DE INCUBACIÓN**
Para el control y prevención de infestaciones por *Aspergillus fumigatus* es indispensable desinfectar todas las instalaciones (locales y máquinas)

**Incubadoras y nacedoras**
Antes de cargarlas, desinfectar por pulverización suelo, paredes, techo y puertas con la emulsión diluida de ACTIFUCIN, a razón de 1 litro por cada 75 $m^2$ de superficie a desinfectar.

**Salas de incubación, de nacimiento y expediciones**
La noche anterior y posterior a la carga de huevos y a la manipulación de los pollitos al nacimiento, nebulizar el ambiente con la emulsión diluida de ACTIFUCIN a razón de 1 litro por cada 300 $m^3$ de local. En salas infestadas, estos tratamientos se efectuarán sin interrupción durante 4 semanas como mínimo. En plan preventivo desinfectar 1 ó 2 veces al mes.

**Contraindicaciones y efectos secundarios**
No se han descrito.

**Interacciones**
ACTIFUCIN no se inactiva en presencia de otros desinfectantes (incluido el formol), insecticidas, ectoparasiticidas y detergentes habituales. Permanece activo incluso en presencia de materia orgánica y a muy diferentes temperaturas ambientales.

**Precauciones especiales para su utilización**
La solución concentrada de ACTIFUCIN se utilizará, siempre y en todo caso, diluida en agua a la proporción fijada en el modo de empleo (1/100).
El empleo de ACTIFUCIN no supone riesgo alguno para la fauna ni demás aspectos ecológicos.
Ver información toxicológica.

**Precauciones particulares de conservación**
Conservar el producto sin diluir, protegido de la luz y de temperaturas extremas.

**Tiempo de espera**
No precisa

**INFORMACION TOXICOLOGICA**

***Clasificación toxicológica y condiciones de peligrosidad***
Nocivo

| | |
|---|---|
| R20/22 | Nocivo por inhalación y por ingestión |
| R41 | Riesgo de lesiones oculares graves |

***Consejos de prudencia***

| | |
|---|---|
| S2 | Manténgase fuera del alcance de los niños. |
| S13 | Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. |
| S23 | No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. |
| S26 | En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. |
| S36/37/39 | Usen indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. |
| S45 | En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta) |

***Uso exclusivo por personal especializado***

***Antídotos y recomendaciones al médico en caso de intoxicación o accidente***

<u>Síntomas de intoxicación</u>
Dermatitis. Irritación ocular severa. Vómitos, diarrea. salivación, lagrimeo, temblores.

Primeros auxilios:
- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administrar nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Si la persona está consciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Controle la respiración, si fuera necesario, respiración artificial.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO

Consejos terapéuticos:
En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia.
Administrar solución acuosa de carbón activado y un catártico salino de sulfato sódico.
Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACION, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA. Tfno. (91) 562 04 20

**PRESENTACIONES**
Frascos de 100 ml, 1000 ml y 5000 ml.
Envase con 4 sobres de 10 ml

veterinaria ESTEVE
**Laboratorios Dr. Esteve S.A.**
Av. Mare de Déu de Montserrat, 221
08041 BARCELONA