PURIFIN

Tratamiento integral de purines en las explotaciones ganaderas.

En la putrefacción se pierden las formas valiosas del nitrógeno ya que las bacterias anaeróbicas transforman el nitrógeno proteico en sustancias no asimilables por las plantas.

PURIFÍN favorece las fermentaciones aeróbicas y por tanto transformar el nitrógeno proteico en compuestos de nitrógeno asimilables por las plantas.

Por tanto con PURIFÍN vamos a lograr los siguientes efectos:

- Evitamos la formación de costras que dificultan la fermentación aeróbica, asegurando la licuación y homogeneización del purín.

- Eliminación de olores molestos y perjudiciales provocados por el amoníaco y ácido sulfhídrico.

- Aumentamos el valor fertilizante del purín, transformando la mayor parte del nitrógeno proteico en nitrato amónico (nutriente de las plantas).

- El menor encostramiento del purín genera una ambiente menos propicio para la eclosión de larvas e insectos.

Composición

Degradadores químicos de materia orgánica, floculantes, colorantes y esencia.

Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido opaco verde, con olor característico.
pH	4,50 ± 0,50
Densidad (20ºC) / g·cm^{-3}	1,02 ± 0,02
Solubilidad	Totalmente soluble en agua

Aplicaciones

PURIFIN es una formulación diseñada para el tratamiento integral de purines, licuación del purín, degradación de la materia orgánica, eliminación de olores, etc.

Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto.

ProquiDeza
Pol. Ind. Lalín 2000, Parc. C42/43
36500 Lalín (Pontevedra) - España
Tlf.: (+34) 986 787 537
info@proquideza.com
www.proquideza.com

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0870/2003
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2005/0529
AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 SST-0121/2016

PURIFIN

Modo de empleo

El tratamiento será siempre el mismo independiente del origen del purín (vacuno, porcino, cunícola, caprino, bufalino, ovino, etc.)

Se hace distinción en la aplicación entre el tratamiento de rejilla y de fosa externa:

- Tratamiento de la rejilla:

Aplicar 2 litro de PURIFÍN en 50 litros de agua para 50/60 m^2 de rejilla una vez a la semana durante tres semanas consecutivas. Luego 1 vez al mes. Evitar el contacto directo del producto con los animales.

- Tratamiento de la fosa:

Aplicar 2 litros de PURIFÍN para 10 - 15 m^3, disueltos en agua suficiente para encharcar el purín, una vez a la semana durante tres semanas consecutivas. Posteriormente aplicar el producto si se observa formación de costras.

Nota: EN AMBOS TRATAMIENTOS ES NECESARIO MANTENER EL PURÍN ENCHARCADO EN AGUA PARA QUE EL PRODUCTO ACTÚE.

Presentación

5 kg **20 kg**

Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto.

ProquiDeza
Pol. Ind. Lalín 2000, Parc. C42/43
36500 Lalín (Pontevedra) - España
Tlf.: (+34) 986 787 537
info@proquideza.com
www.proquideza.com

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0870/2003
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2005/0529
AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 SST-0121/2016