Distribuido por
IBYSAN PRODUCTOS SANITARIOS AUXILIARES
S.L. Sector Foresta, 37 local Izquierdo -
28760 Tres Cantos (MADRID).
Tel.: 918 046 164.

FICHA TÉCNICA

IBYSGAN CEBO FRESCO

Rodenticida cebo en pasta listo para su uso

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Composición:
Bromadiolona 0,005 %
Excipientes c.s.p. 100 %

2. DESCRIPCIÓN

IBYSGAN CEBO FRESCO es un cebo en pasta, listo para su uso, para el control de Rata gris (*Rattus norvegicus*) y Ratón común (*Mus musculus*), eficaz con una sola dosis. Los roedores mueren a los pocos días (3-5) de la ingestión sin despertar sospecha o alarma hacia el cebo por el resto de miembros de la colonia. IBYSGAN CEBO FRESCO contiene sustancias inertes atractivas para los roedores e incorpora una sustancia de sabor amargo *(Denatonium Benzoato*) para prevenir la ingesta accidental por animales no diana.

IBYSGAN CEBO FRESCO puede usarse para el control de ratas y ratones en el interior y alrededor de instalaciones porcinas, avícolas, bovinas, ovinas, caprinas, equinas entre otras, así como en granjas, criaderos de ganado, parques zoológicos, residencias caninas, chiqueros, apriscos de ganado, etc.

3. MODO DE EMPLEO

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta y síganse las instrucciones propuestas. Las bolsitas de cebo se colocarán sin abrir en los portacebos. Los portacebos cargados deben ser colocados de forma segura, fijados al suelo y situados en áreas inaccesibles a niños, animales de compañia y otros animales a los que no va destinado el producto. No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo.
Se debe evitar su utilización en aquellas áreas donde existan indicios de resistencia al ingrediente activo. Con el objetivo de prevenir el desarrollo y diseminación de resistencias, se deberá asegurar la susceptibilidad de los roedores a la Bromadiolona antes de comenzar el tratamiento. Después de la campaña de control se debería comprobar que se han alcanzado los objetivos previstos.
El producto IBYSGAN CEBO FRESCO, aplicado por personal

Rev. 0
MAR2014

profesional, se localizará en portacebos correctamente etiquetados, en el interior y alrededor de edificaciones e instalaciones fijas o móviles estrechamente relacionadas con la explotación ganadera (sin superar una distancia máxima de 0,5 metros entre el portacebos y la edificación/instalación). Si el producto va a utilizarse en zonas públicas, se deben incorporar las siguientes precauciones de seguridad: Las zonas tratadas deben estar señalizadas durante el periodo de tratamiento y junto a los cebos debe figurar un aviso que explique el riesgo de envenenamiento primario o secundario provocado por el anticoagulante, y en el cual también se deberán indicar las primeras medidas que deben tomarse en caso de envenenamiento.

Para un apropiado control de la infestación de los roedores, es aconsejable realizar las siguientes fases:

Inspección del área: Antes de colocar el cebo, llevar a cabo una inspección del lugar para establecer el tipo (es decir, especies de roedores), el nivel y el grado de infestación. Anotar los posibles puntos de acceso de los roedores, madrigueras, escondites y eliminar todas las fuentes de agua y alimentos. La reducción de la disponibilidad de alimentos alternativos al inicio del tratamiento puede animar a los roedores a alimentarse de los cebos. Para reducir al mínimo el uso de cebos raticidas, en particular para el control de roedores en áreas o zonas sensibles, el uso de cebos no tóxicos debe ser el método más adecuado.

Tratamiento: Con la ayuda de guantes de protección colocar el cebo en el interior de los portacebos correctamente etiquetados.

Monitorización: Se deben realizar inspecciones periódicas de los puntos de cebo (se recomienda cada 3 ó 4 días), y reemplazar cualquier cebo que haya sido consumido por los roedores, dañado por el agua o contaminado por la suciedad.

Fin del tratamiento: El periodo de tratamiento finaliza cuando los cebos dejan de ser consumidos. Después de la campaña de control se debe comprobar que se ha alcanzado los objetivos previstos.

Dosis de aplicación:

Ratones: Portacebos con hasta 50 g de producto cada 2-5 metros (dependiendo del grado de infestación).

Ratas: Portacebos con hasta 100 g de producto cada 5-10 metros (dependiendo del grado de infestación).

4. PRECAUCIONES

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Se deben lavar las manos y las zonas de piel expuestas después de la aplicación del producto. Para minimizar problemas de resistencias y el riesgo de envenenamiento primario el producto no debe ser utilizado como cebo permanente para prevenir la aparición de roedores. Para evitar las resistencias es aconsejable alternar cebos que contengan diferentes sustancias activas anticoagulantes. Para minimizar el riesgo de envenenamiento secundario, se deberán buscar y retirar los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, como mínimo con la misma frecuencia que son comprobados y/o repuestos los cebos. No tirar el producto en el suelo, en un curso de agua, en el fregadero o en el desagüe. Almacenar el producto en su envase original, cerrado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado de la radiación solar y otras fuentes de calor. Proteger frente a las heladas. Mantener alejado de fuentes de fuerte olor. Contiene un agente amargante y un colorante. Las condiciones de transporte del producto deben ajustarse a lo establecido en la legislación nacional. Los envases vacíos, los roedores muertos, los cebos y los portacebos deben depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local de conformidad con sus respectivas ordenanzas.

Consejos de prudencia:
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer la etiqueta antes del uso. P280: Llevar guantes y prendas protectoras. P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmeditamente a un CENTRO de información toxicológica o a un médico.

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

Número de inscripción en el registro de biocidas: ES/RM-2014-14-00134 – IBYSGAN CEBO FRESCO
Titular del registro: ZAPI QUIMICAS IBERICA, S. L.

Distribuido por:
IBYSAN PRODUCTOS SANITARIOS AUXILIARES, S.L.
Sector Foresta, 37 28760 Tres Cantos Madrid
Teléfono: 918 046 164
Fax: 918 046 038
Teléfono de atención al cliente: 902 190 551