FICHA TÉCNICA

SOURIN Xtreme-Bloque

INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO

FRAP® BLOQUE
Número de inscripción : ES/MR(NA)-2018-14-00041
TP 14, Rodenticida
Titular del registro : Liphatech S.A.S. – Bonnel – BP 3 – 47480 Pont Du Casse (Francia)
Composición : Difetialona 0.0025% w/w (25 mg/kg) (CAS no 104653-34-1)
Este producto contiene un agente amargante y un colorante.
Tipo de formulación : Cebo en bloque listo para su uso
Categoría de usuario : Público en general (usuario no profesional)
Organismos diana : ratón común (Mus musculus), rata parda o de alcantarilla (Rattus norvegicus) y rata negra (Rattus rattus), juveniles y adultos.
Ámbito de utilización : Interior o Alrededor de edificaciones

INDICACIONES

FRAP® BLOQUE es un cebo rodenticida en bloque, listo para su uso, destinado al tratamiento de ratas y ratones en interiores y alrededor de edificaciones. Bloque de 20 g. Contiene el agente amargante Bitrex®: Riesgo reducido de ingestión accidental por humanos, sin reducción de palatabilidad para roedores. (Bitrex®marca registrada de Macfarlan Smith)
Lea y siga la información proporcionada del producto así como cualquier otra información que acompañe al producto o proporcionada en el punto de venta antes de usarlo.

INSTRUCCIONES DE USO

Cebo en bloque listo para su uso - Utilizar sólo en portacebosresistentes a la manipulación
Antes de usar productosrodenticidas, se recomiendala utilizaciónde métodosno químicos(ej.: trampas)
Retirarla comida fácilmentedisponiblepara los roedores(ej.: grano suelto o residuosde alimentos).Aparte de esto, no limpiar la zona a tratar justo antes del tratamiento, esto solo molestará a los roedores y la aceptación del cebo será más difícil de alcanzar. Los portacebos deben ser colocadosen las inmediacionesde los lugaresdonde se ha observadoactividadde roedores(zonas de paso, sitios de anidación,cebaderos,agujeros, madrigueras...).
Dependiendo del organismo y del nivel de infestación, aplique la cantidad y respete la distancia entre portacebosindicadas:

		Dosis de aplicación por punto de cebo	Distancia entre portacebos
Rata perda / Rata negra	Interior / Alrededor de edificaciones (*)	Hasta 200g	4 a 5 metros
Ratón	Interior	Hasta 50g	1 a 1,5 metros

No abrir la bolsita que contiene el cebo

Cuando sea posible, el portacebos debe estar fijado al suelo o a otras estructuras. Los portacebos deben etiquetarse con la siguiente información: “no mover o abrir”; “contiene un rodenticida”; “nombre del producto o número de autorización”; “difetialona“; “en caso de accidente, llame al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono 91 562 04 20)“; “Eliminar los portacebos, al final de su vida útil, como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales.”.
Colocar los portacebos fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y otros animales a los que no va destinado el producto.
No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, bebidas, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo.
No colocar los portacebos cerca de sistemas de drenaje de agua donde el cebo pueda entrar en contacto con el agua.
Durante el uso del producto no comer, beber o fumar. Lavar las manos y áreas de piel expuestas después de utilizar el producto.
Los portacebos deben revisarse (para ratones al menos cada 2—3 días al comienzo y para ratas a los 5 — 7 días después del comienzo) del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos. Recargar el portacebos cuando sea necesario.
Se recomienda el uso de guantes. Debido al modo de acción retardado, los rodenticidas anticoagulantes pueden tardar entre 4 y 10 días en ser efectivos tras el consumo del cebo.
Retirar el cebo sobrante y el portacebos al final del tratamiento.

Uso en alrededores: Colocar el portacebos en áreas no sujetas a inundación. Reemplazar los cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad.

SOLO PARA PUBLICO EN GENERAL

SOURIN Xtreme-Bloque

MEDIDAS ADICIONALES DE PRECAUCIÓN

Aplicar medidas de control preventivas (ej.: taponar agujeros, retirar comida y bebida en la medida de lo posible) para mejorar la ingesta de cebo y reducir la probabilidad de reinvasión.
No usar el producto como cebo permanente para la prevención de infestaciones de roedores o para detectar la actividad de los roedores. El uso de este producto debería eliminar los roedores en un plazo de 35 días. La información del producto (ej.: etiqueta y/o folleto) deberá recomendar que en caso de sospecha de falta de eficacia al final del tratamiento (ej.: la actividad de los roedores sigue observándose) el usuario deberá contactar con el suministrador del producto o llamar a un servicio de control de plagas. Buscar y retirar los roedores muertos durante el tratamiento, como mínimo siempre que se revisen los portacebos.
Los roedores son transmisores de enfermedades. No tocar los roedores muertos con las manos sin guantes, utilice guantes o utensilios tales como pinzas para su eliminación.
Eliminar los roedores muertos como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales.

RECOMENDACIONES CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Este producto contiene una sustancia anticoagulante. En caso de ingestión, los síntomas pueden hacerse evidentes hasta en un plazo de 72 horas. Las manifestaciones clínicas pueden incluir sangrado de nariz y encías. En casos severos, puede haber moratones y presencia de sangre en heces u orina.
Antídoto: vitamina K1 administrada únicamente por personal médico/veterinario.

En caso de :

- Exposición dermal, lavar la piel con agua y a continuación con agua y jabón.
- Exposición ocular, enjuagar los ojos con líquido para enjuagar los ojos o agua, mantener los ojos abiertos al menos 10 minutos.
- Exposición oral, enjuagar la boca cuidadosamente con agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No provocar el vómito. Si se ingiere, busque consejo médico, mantenga a mano la etiqueta o el envase y consulte al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA (Teléfono 91 562 04 20). Contacte con un veterinario en caso de que lo ingiera una mascota.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el envase cerrado y alejado de luz. Mantener alejado de los niños, pájaros y animales de compañía y granja.

INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACION

Al final del tratamiento elimínese el cebo no consumido y el envase como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales.

H373 Puede provocar daños en los órganos (sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes de protección.
P314 Consultar a un médico en caso de malestar.
P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente, así como los roedores muertos, como residuo peligroso de conformidad con lo que establezccan las ordenanzas municipales

ATENCIÓN

Peligroso para la fauna salvaje.
Peligroso para perros y gatos

Distribuido por: VESTA DISTRIBUCION IPM, S. L. U Avda. Pirineos, 9 Nave 5 – Pol. Ind. Sur 28703 – San Sebastian de los Reyes (MADRID)
Telf:+34 916357529–www.vestahorga.es -
La Ficha de Datos de Seguridad de este producto está disponible bajo petición. ® FRAP®, una marca registrada de LIPHATECH

SOLO PARA PUBLICO EN GENERAL