NEPOREX® 2 SG

LARVICIDA

DESCRIPCIÓN

Larvicida contra las larvas de moscas que se desarrollan en el estiércol y purín de las instalaciones ganaderas.

USO

Aplicar sobre los suelos de la instalación disuelto en agua mediante regado.

Debe aplicarse sobre acumulaciones de materia orgánica, que es donde las moscas se posan para desovar.

Método de aplicación y dosificación:

→ ***Regado:*** *250 g / 10 litros para 10 m² de estiércol*

Aplicaciones: *Las condiciones de temperatura y humedad pueden variar según la región y de un año para otro. La duración y la sincronización de los programas de control de moscas deberían ajustarse en concordancia con estas variaciones. Neporex debe aplicarse* ***antes de que empiece el ciclo de la mosca****, o sea antes de que la temperatura en el interior de explotación supere los 12ºC [1]. Según el tipo de explotación, si esta temperatura se mantiene todo el año, se recomienda el uso de Neporex durante todo el año.*

[1] *Acharya N. House fl y (Musca domestica L.) management in poultry production using fungal biopesticides. Doctoral Thesis, The Pennsylvania State University. 2015. Available at: https://etda.libraries.psu.edu/fi les/final_submissions/10904. Accessed Jan 08, 2019.*

FORMATO

Bolsas de 5 Kg.
Cajas de 20 Kg.

COMPOSICIÓN

20 g de Ciromazina por Kg.

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.

VENTAJAS

- Facilita la lucha contra la mosca adulta
- De fácil aplicación disuelto en agua.
- La ciromazina hace que las larvas tratadas no muden al estadio siguiente, provocando que el ciclo de la mosca se vea interrumpido.

Neporex, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus filiales.
© 2025 Elanco Animal Health. PM-ES-25-0315

myElanco™

Un producto de
Elanco Spain SLU.

Av. de Bruselas, 13- 2º A
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: 91 903 38 40
www.elanco.es