TOTALKILL

INSECTICIDA, ACARICIDA, OVICIDA, LARVICIDA CON EFECTO REMANENTE

Use los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.

R.O.P.Z.: 03216-P

Indicaciones y Usos

- Activo frente a todo tipo de artrópodos: moscas, mosquitos, ácaros, cucarachas, hormigas, piojos, garrapatas, etc. en todo tipo de instalaciones de entorno ganadero.
- Indicado para aquellos casos en los que se quiera prevenir reinfestaciones cortando el ciclo vital de los insectos, actuando sobre las larvas al mismo tiempo.
- Puede emplearse tanto en exteriores como interiores.
- Uso exclusivo personal especializado.

Características Técnicas

Aspecto	Líquido Amarillento
Olor	Característico
Densidad a 20 ºC	0,971 ± 0,03 g/mL

- ✓ Rápido efecto insecticida por ingestión y contacto con alto poder de desalojo, volteo y muerte a dosis bajas.
- ✓ Efecto larvicida gracias al piriproxifen, lo que permite abarcar todo el ciclo de vida de los insectos.

Acerca del Piriproxifen

- PIRIPROXIFEN es una hormona juvenoide que interfiere en la transformación de la pupa al estado adulto de los insectos, actuando como regulador del crecimiento.
- La muerte del insecto se produce en la fase de pupa, impidiendo que el insecto pase a la fase adulta y por tanto que se reproduzca.
- Según estudios realizados, comparado con otros, la dosis efectiva de piriproxifen frente a otros larvicidas inhibidores de la quitina (como el Diflubenzuron) muestran mucha mayor efectividad del piriproxifen como regulador del crecimiento de insectos.

Los resultados obtenidos muestran que el principio activo del TOTALKILL es hasta 60 veces más potente que otros larvicidas como el Diflubenzurón.

Comparativa Piriproxifen / Diflubenzurón



Las concentraciones letales o inhibiciones de emergencia IE90 (muerte del 90% de los insectos), calculadas para Ae. aegypti, cepa Rockefeller, con PIRIPROXIFEN fueron 0,1061 ppb y con Diflubenzurón 6,7553 ppb.

SOMVITAL BIOSAFETY

+34 **876 26 87 69**
info@somvital.com
www.somvital.com

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Modo de Empleo

- Diluir en agua del 0,2 al 1% (de 2 a 10 mL por litro de agua) según modo de empleo, lugar de aplicación, suciedad y nivel de infestación.
- Recomendable agua caliente para realizar la dilución (30-40ºC).

✓ *Dípteros: 0,2% (2 mL / L de agua)*
✓ *Rastreros: 0,5% (5 mL / L de agua)*

- En infestaciones moderadas, aplicar 50 - 100 ml de dilución por m^2 de superficie a tratar.
- En infestaciones severas aplicar de 200 - 300 ml de dilución por m^2 de superficie a tratar procurando mojar bien la superficie.
- Plazo de seguridad: 12 horas.

Productos formulados con tecnología de bajo impacto medioambiental, que se caracterizan por la ausencia de solventes orgánicos, tal como hidrocarburos alifáticos o aromáticos. En su lugar se utilizan solventes de reciente desarrollo, de rápida biodegradabilidad y baja reactividad, más respetuosos con el medio ambiente y mayor seguridad para las personas.

Composición

- Alfacipermetrina 8%
- D-tetrametrina 2%
- Butóxido de piperonilo 10%
- Piriproxifen 1%
- Disolventes y excipientes

Propiedades

- Posee actividad larvicida por ingestión y por contacto.
- Evita que el insecto llegue a fase adulta y se reproduzca.
- Elevada persistencia, mayor posibilidad de que el insecto entre en contacto con el producto.
- La asociación con d-tetrametrina, le confiere un efecto de volteo de las larvas presentes en el entorno, inmovilizándolas.
- Se puede aplicar conjuntamente con Neokill, ocasionando una acción sinérgica: Larvicida y adulticida.
- Actúa a dosis 60 veces inferiores a otros larvicidas.
- Menores resistencias.
- Doble acción: destrucción de pupas e inmovilización de larvas.

LETAL CONTRA LOS ARTRÓPODOS
MÁXIMA EFICACIA

+34 **876 26 87 69**
info@somvital.com
www.somvital.com

SOMVITAL
BIOSAFETY