FICHA TÉCNICA

BRODITOP SENSITIVE PASTA FLUO-NP

R.D.G.S.P. N°: ES/MR (NA)-2018-14-00492 (USO POR EL PROFESIONAL)

Rodenticida en pasta fresca fluorescente

DESCRIPCIÓN

BRODITOP SENSITIVE PASTA FLUO-NP es un cebo en pasta listo para uso (en bolsitas de 15 g) que contiene el ingrediente activo anticoagulante de segunda generación, Brodifacoum, eficaz con una sola ingestión. Incorpora también una sustancia de sabor amargo *(Denatonium Benzoato)* para prevenir la ingesta accidental por animales no diana.
Gracias a su modo de acción, la muerte de los roedores se produce sin despertar sospechas hacia el cebo por parte de los demás miembros de la colonia.

- ✓ **Tecnología FLUO-NP®:**
  Gracias a una tecnología de pigmento fluorescente, el cebo se puede identificar fácilmente incluso en condiciones de poca luz. Cuando el cebo es consumido por los roedores, la formulación fluorescente hace que las heces de los roedores sean claramente visibles bajo la luz UV, lo que proporciona la oportunidad de monitorear la actividad de los roedores.

- ✓ **PASTA Plus** (patente europea n° 1 279 334 B1):
  Formulación patentada que combina una mezcla bien equilibrada de componentes de origen alimentario, como harina de leche, azúcar y grasas enriquecidas con cereales, especialmente palatable para las especies de roedores mencionadas anteriormente.

- ✓ **Alta apetibilidad**
  BRODITOP SENSITIVE PASTA FLUO-NP es extremadamente atractivo y su uso esta indicado en áreas que ofrezcan una fuerte competencia por los alimentos.

COMPOSICIÓN

Brodifacoum 0,0029% y Excipientes c.s.p. 100%

FORMULACIÓN

Cebo en pasta de porciones de 15 g

CONTRA

Rata gris, Ratón común

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.

PESTNET ESPAÑA S.L.,
Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid)
Tel. 918 046 164
www.pestnet-europe.es

MODO DE EMPLEO

BRODITOP SENSITIVE PASTA FLUO se localizará en portacebos correctamente etiquetados.

Para el control de ratón común *(Mus musculus)* - interior:

- Alta infestación: hasta 50 g de cebo por punto de cebo, cada 2 m.
- Baja infestación: hasta 50 g de cebo por punto de cebo, cada 5 m.

Los portacebos deben revisarse al menos cada 2 - 3 días al comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos. Recargar el portacebos cuando sea necesario.

Para el control de rata parda o de alcantarilla *(Rattus norvegicus)* - interior y alrededor de edificaciones:

- Alta infestación: hasta 90g de cebo por punto de cebo, cada 5 m.
- Baja infestación: hasta 90g de cebo por punto de cebo, cada 10 m.

Los portacebos deben revisarse a los 5 - 7 días después del comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos.
Recargar el portacebos cuando sea necesario. Seguir las instrucciones adicionales proporcionadas por el Manual de Buenas Prácticas.

Alrededor de edificaciones: Proteger los cebos de las condiciones atmosféricas (ej: lluvia, nieve, etc). Colocar el portacebos en zonas no sujetas a inundación. Reemplazar los cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad.

INSTRUCCIONES

Realice una encuesta previa al tratamiento del área infestada y una evaluación in situ para identificar las especies de roedores, sus áreas de actividad y determine la causa y la extensión de la infestación. Retirar la comida fácilmente disponible para los roedores (ej: grano suelto o residuos de alimentos). Aparte de esto, no limpiar la zona a tratar justo antes del tratamiento, esto solo molestará a los roedores y la aceptación del cebo será más difícil de alcanzar. El producto debe ser usado como parte de un plan integral de control de plagas, incluyendo, entre otros, medidas de higiene y, cuando sea posible, métodos físicos de control. Aplicar medidas de control preventivas (ej: taponar agujeros, retirar comida y bebida en la medida de lo posible) para mejorar la ingesta de cebo y reducir la probabilidad de reinvasión. Los portacebos deben ser colocados en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores (zonas de paso, sitios de anidación, cebaderos, agujeros, madrigueras…). Cuando sea posible, el portacebos debe estar fijado al suelo o a otras estructuras. Cuando el producto se utilice en zonas públicas, las zonas tratadas deben marcarse durante el periodo de tratamiento y una señal explicativa debe informar sobre el riesgo de envenenamiento primario y secundario de los anticoagulantes así como sobre las medidas de primeros auxilios. Los cebos deben ser asegurados para evitar que sean arrastrados fuera del portacebos. Colocar los portacebos fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y otros animales a los que no va destinado el producto. Utilizar guantes de protección resistentes a productos químicos durante la fase de manipulación del producto (EN 374, categoría III). No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, bebidas, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo. Durante el uso del producto no comer, beber o fumar. Lavar las manos y áreas de piel expuestas después de utilizar el producto. Si la

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.

PESTNET ESPAÑA S.L.,
Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid)
Tel. 918 046 164
www.pestnet-europe.es

cantidad de cebo ingerido es baja en relación al tamaño aparente de la infestación, se debe considerar la colocación de más portacebos y la posibilidad de cambiar a otra formulación cebo. Si después de un periodo de tratamiento de 35 días se observa que los cebos siguen siendo consumidos y no disminuye la actividad de roedores, debe determinarse la causa. Cuando se hayan excluido otros elementos, es probable que para los roedores resistentes haya que considerar el uso de un rodenticida no anticoagulante o un rodenticida anticoagulante más potente. También debe considerarse el uso de trampas como una medida de control alternativa. Retirar el cebo sobrante y el portacebos al final del tratamiento. No abrir la bolsita que contiene el cebo.

Medidas de mitigación del riesgo:
Cuando sea posible, antes del tratamiento informar a los transeúntes (ej: usuarios del área tratada o sus alrededores) sobre la campaña de control de roedores (de acuerdo con el código aplicable de buenas prácticas, si lo hay). Para reducir el riesgo de envenenamiento secundario, buscar y retirar los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento (ej: al menos dos veces por semana). Cuando sea relevante especificar si una inspección más frecuente o diaria se requiere. Los productos no deberán utilizarse más de 35 días sin una evaluación del estado de la infestación y de la eficacia del tratamiento. No utilizar cebos que contengan sustancias activas anticoagulantes como cebos permanentes para la prevención de infestaciones de roedores o para la monitorización de la actividad de los roedores. El producto no deberá ser suministrado al público en general. Utilizar solo en portacebos resistentes a la manipulación. Etiquetar los portacebos de acuerdo a las recomendaciones del producto. El uso de este producto debería eliminar los roedores en un plazo de 35 días. En caso de sospecha de falta de eficacia al final del tratamiento (ej: la actividad de los roedores sigue observándose) el usuario deberá contactar con el suministrador del producto o llamar a un servicio de control de plagas. No lavar el portacebos con agua entre aplicaciones. Eliminar los roedores muertos como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales. Alrededor de edificaciones: No aplicar directamente en madrigueras.

Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase:
Al final del tratamiento elimínese el cebo no consumido y el envase como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales. En la etiqueta de los portacebos se indicará lo siguiente: Eliminar los portacebos, al final de su vida útil, como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales.
Almacenar el producto en su envase original, cerrado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado de la radiación solar y otras fuentes de calor. El producto es estable durante dos años.

PRESENTACIÓN
Envase de 3 kg en bolsitas de 15 g

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.

PESTNET ESPAÑA S.L.,
Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid)
Tel. 918 046 164
www.pestnet-europe.es